



AminoRoot®



Es un fertilizante y bioestimulante líquido, para raíces, a base de aminoácidos libres, extractos vegetales, ácidos fúlvicos y materia orgánica activa, destinado a promover y fortalecer el crecimiento de raíces en todo tipo de frutales, hortalizas y cultivos.

Favorece el crecimiento de raíces induciendo un sistema radical abundante y vigoroso.

BENEFICIOS

- ✓ Favorece el crecimiento de raíces induciendo un sistema radical abundante y vigoroso.
- ✓ Mejora la vitalidad de las plantas incrementando la captación y absorción de nutrientes y agua.
- ✓ Induce formación de plantas más sanas, resistentes y vigorosas

TIPO DE APLICACIÓN



Fertirriego



Drench

COMPOSICIÓN

Materia Orgánica	15% p/p
Aminoácidos Libres	8% p/p
Ácidos Fúlvicos	9,5 % p/p
Extractos de Origen Vegetal	0,12% p/p
Nitrógeno	2,5% p/p
Fósforo (P2O5)	1% p/p
Potasio (K2O)	0,3% p/p
Calcio (CaO)	0,5% p/p
Magnesio (MgO)	0,5% p/p
Zinc (Zn)	50 ppm
Boro (B)	3 ppm
Manganeso (Mn)	6 ppm
Hierro (Fe)	400 ppm
Metales Pesados (As, Hg, Cd, Pb)	≤ 2 mg/kg
Solubilidad en agua	97% a 20°C
pH	3,5
Densidad	1,1 g/L, a 20°C

*Producto libre de Escherichia coli y Salmonella.



aminochem

From the sea. For your crops.



AminoRoot®

CULTIVOS	DOSIS SUELO L/HA	FORMA DE APLICACIÓN
Pomáceas (Manzanos, Perales, Membrillos); Carozos (Ciruelos, Duraznos, Nectarines, Cerezos); Frutos Secos (Nogales, Almendros, Avellanos); Vides (viníferas, Pisuergas, Mesa) Cítricos (Limonos, Naranjos, Mandarinos, Clementinas); Paltos, Olivos y Granados.	2-3	Aplicar desde inicio de primer flush radicular primaveral. Repetir en postcosecha.
Establecimientos de Vides y Frutales.	1,5-2	Aplicar post plantación una vez que la planta haya comenzado a brotar.
Frutales menores (Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Cranberry).	2-3	Aplicar desde inicio de primer flush radicular primaveral. Repetir en postcosecha.
Hortalizas de Hoja y Tallo (Lechuga, Repollo, Acelga, Apio). Hortalizas de Bulbo (Zanahoria, Betarraga, Achicoria, Rabanito). Hortalizas de Flor (Coliflor, Brócoli, Alcachofas). Hortalizas de Fruto (Pepino, Tomate, Pimiento, Melón, Sandía).	1-2	Aplicar a partir de 7 días post trasplante o post emergencia. Repetir segunda y tercera aplicación cada 15 días.

www.aminochem.com

e-mail: contacto@aminochem.com ■ Síguenos en: [f](#) [@](#) [in](#)



aminochem
From the sea. For your crops.